



Administration de dalbavancine injectable

Glycopeptides

But et objet

Cette procédure vise à émettre des recommandations de bonne dilution et administration concernant la prescription **dalbavancine** au CHU et au sein du GHT

Exigences à appliquer

- Procédure d'administration des produits par pousse-seringue électrique
- Respect des textes professionnels en vigueur
- Code de la Santé Publique
- Décret infirmier
- Respect de la prescription médicale
- Respect des règles d'hygiène

Responsabilités

- Prescription** : médecins/internes en médecine ou chirurgie
- Validation pharmaceutique** : pharmaciens, internes de pharmacie
- Préparation/administration** : infirmier

Définitions

- Dalbavancine** : antibiotique de la famille des lipoglycopeptides
- Dosage** : 500 mg
- Voies** : IV

Actions et méthodes

- Reconstitution** : EPPI 25 ml

Dilution :

- Ne pas agiter car formation de mousse, laisser poser 5 minutes
- Coloration jaune pâle
- G5% exclusivement (incompatible avec NaCl)**
- Concentration finale 1 à 5 mg/ml soit 500 mg dans 100 ml

Modalités d'administration :

- IVL 30 minutes
- Administration hebdomadaire ou par quinzaine (demi-vie très longue)

- Résiduelle** : à faire avant la réinjection, permet d'établir la fréquence des réinjections

- Stabilité** : 24 h à température ambiante entre 12° et 25° C

Effets indésirables :

Digestifs : nausées, diarrhées

Céphalées

Élévation des transaminases

Contre-indications : hypersensibilité à la substance

Interactions médicamenteuses : Ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments ou solutions IV, contenant du NaCl.

Remarque :  pas de contact avec du NaCl

Prescription/délivrance/PEC :

Réserve hospitalière

Rédacteurs

Sophie BOISSIER, Anne MAINGUY, Laetitia ROLLAND (IDE expertes en ATB)

Dr PATRAT-DELON Solène

Approbateurs

Pr REVEST Matthieu

Dr PATRAT-DELON Solène

Dr BACLE Astrid