

But et objet

Cette procédure vise à émettre des recommandations de bonne dilution et administration concernant la prescription **Extencilline** au CHU et au sein du GHT

Exigences à appliquer

- Procédure d'administration des produits par pousse-seringue électrique
- Respect des textes professionnels en vigueur
- Code de la Santé Publique
- Décret infirmier
- Respect de la prescription médicale
- Respect des règles d'hygiène

Responsabilités

- Prescription** : médecins/ internes en médecine ou chirurgie
- Validation pharmaceutique** : pharmaciens, internes de pharmacie
- Préparation/ administration** : infirmier

Définitions

- Benzathine - benzylpénicilline** : antibiotique de la famille des bêta-lactamines/ pénicillines

- Dosage** : 1.2 MUI et 2.4 MUI

- Voies** : IM

Actions et méthodes

Reconstitution :

- Dans 8 ml de lidocaïne 20 mg/ ml - 400 mg/ 20 ml

Modalités d'administration :

- IM lente
- Bien agiter la suspension avant emploi
- Ne pas masser après injection

Effets secondaires indésirables :

- Douleur au point de ponction

Contre-indications :

- Allergie aux pénicillines
- Patient sous AVK ou trouble de l'hémostase

- Remarque** : risque d'amas du produit qui bouche l'aiguille

Prescription/délivrance/PEC :

Disponible en ville

Rédacteurs

Sophie BOISSIER, Anne MAINGUY, Laetitia ROLLAND (IDE expertes en ATB)

Dr PATRAT-DELON Solène

Approbateurs

Pr REVEST Matthieu

Dr PATRAT-DELON Solène

Dr BACLE Astrid