CRAtb
Centre Régional en Antibiothérapie de Bretagne

Infection sexuellement transmissible

Condylomes et HPV

Fiche mémo

Agent pathogène

- **Certains HPV sont oncogènes.** Leur présence va induire la transformation cancéreuse de certaines cellules sur le très long terme. Ces HPV oncogènes sont responsables de la majorité des cancers du col de l'utérus, des cancers du canal anal et d'une partie des cancers ORL.
- **Certains HPV ne sont pas oncogènes,** et peuvent n'être responsables que de condylomes : gène esthétique et fonctionnelle parfois, mais pas de risque de transformation cancéreuse.

Incubation : peu utile

Symptômes

Condylomes (autrement dit verrue des orifices) ; à terme cancer du col, pénis, anal

Test

- Cas particulier du dépistage du cancer du col de l'utérus (recommandations 2020) :
  - ✓ Pour les femmes entre 25 et 29 ans, le test de dépistage est réalisé par examen cytologique tous les 3 ans, après deux premiers tests réalisés à 1 an d'intervalle et dont les résultats sont normaux.
  - ✓ Pour les femmes de 30 ans à 65 ans, le test HPV-HR est réalisé 3 ans après le dernier examen cytologique dont le résultat est normal. Un nouveau test est refait tous les 5 ans, jusqu'à l'âge de 65 ans, dès lors que le résultat du test est négatif.
- Dépistage HPV chez les HSH au moins une fois dans la vie, rythme de surveillance non établi.

Traitement des condylomes : Exérèse chirurgicale/proctologique

Dépistage des partenaires : Pas de dépistage ce n'est pas qu'une IST

Prévention

- Préservatif, mais ce n'est pas qu'une IST : règles d'hygiène également, comme le non-partage des serviettes.
- Vaccination recommandée et prise en charge par l'assurance maladie
  - ✓ Chez les filles et les garçons de 15 à 19 ans, 3 doses de Gardasil9 (M0, M2, M6). Entre 11 et 14 ans, deux doses suffisent
  - ✓ Chez les HSH, la vaccination peut être réalisée jusqu'à 26 ans (3 doses).

Rédacteur : Dr François Bénézit, infectiologue, CHU Rennes

septembre 2022