


Conduite à tenir en cas de présence de puces



Cycle de vie et transmission



Transmission active et passive

Les puces se déplacent en sautant ou sont transportées passivement via les animaux, les vêtements, les bagages.

Détection

Inspecter :

- les animaux du foyer /établissement
- la maison : tapis, moquettes, parquets, plinthes, panier des animaux
- les individus : pieds, chevilles, mollets, jambes

Traiter

Sources : Risques liés aux arthropodes. Santé publique France, 2022.
L'hygiéniste et le risque infectieux émergent. SF2H, 2019.
Prévention du risque infectieux et médiation/présence animal. CCLin Sud-Est, 2016.
Lutte contre les ectoparasites et agents nuisibles. CCLin Paris-Nord, 2001.

Insecte hématophage sauteur, de couleur brune et mesurant entre 1,5 et 6,5 mm, la puce peut sauter jusqu'à 30 cm de haut, soit 200 fois sa taille.


Durée de vie variable

Elles survivent jusqu'à 2 semaines sans hôte, mais peuvent vivre un an sur un hôte ou rester en diapause (repos) de 6 mois à 1 an.

Réveil par vibration et chaleur

La nymphe passe au stade adulte lorsqu'elle perçoit la présence d'un hôte (chaleur ou vibrations), même après des mois d'inoccupation.

5 %
Adultes



95 %

Menace invisible
(oeufs, larves, nymphes)

Une capacité de ponte phénoménale

Une femelle peut pondre jusqu'à 50 oeufs par jour dans l'environnement pendant 1 mois, totalisant 500 à 2000 oeufs selon l'espèce.

Conduite à tenir

Résident/usager/patient



Hygiène

Douche et shampooing immédiats, habillage avec une tenue propre et traitement systématique des lésions cutanées

Professionnel



Protection du professionnel

Application des précautions standard et port de tenue spécifique lors du bionettoyage : protection des membres inférieurs, surblouse, gants, manchettes

Environnement



Gestion rigoureuse du linge et désinsectisation des locaux

Transport en sacs hydrosolubles étiquetés «ectoparasites» et lavage à 60° suivi de 30 min en sèche-linge.
Procéder en 3 temps : balayage humide, application de l'insecticide (évacuation 1 h), puis second balayage humide.