

Stratégie de vaccination : nouveautés 2025



Développer la qualité dans le champ
sanitaire, social et médico-social

Avis n°2025.0010/AC/SESPEV du 27 février 2025 du collège de la Haute Autorité de santé relatif à la pertinence de réaliser une campagne de vaccination contre la Covid-19 au printemps 2025.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2025-02/avis_2025-0010-ac-sespev_du_27_fevrier_2025_du_college_de_la_has_relatif_a_la_pertinence_de_realiser_une_campagne_de_vaccina.pdf

Printemps 2025

Suite à l'avis de la HAS en date du 27 février 2025, les personnes dont la protection immunitaire diminue plus rapidement dans le temps, pourront bénéficier d'une vaccination supplémentaire contre le Covid-19 au printemps 2025.

Ce rappel concerne :

- Les personnes âgées de 80 ans et plus
- Les immunodéprimés quel que soit l'âge
- Les résidents en Ehpad et USLD
- Les personnes à très haut risque de forme grave, dans le cadre d'une décision médicale partagée avec l'équipe soignante.

Délai d'administration des doses de rappel du vaccin Covid

Le délai à respecter après la dernière injection ou infection est de 6 mois, délai réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans et plus.

Ce renouvellement vaccinal est proposé entre le lundi 14 avril et le samedi 14 juin 2025 avec la possibilité d'être prolongé d'un mois si la situation épidémiologique le justifiait.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION	DGS-URGENT
DATE : 01/12/2023	REFERENCE : DGS-URGENT N°2023-24
TITRE : COVID-19 : MISE A DISPOSITION DU VACCIN ADAPTE NUVAXOVID® XBB.1.5 DU LABORATOIRE NOVAVAX	
Professionnels ciblés ☐ Tous les professionnels ☒ Professionnels ciblés (cf. liste ci-dessous)	

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2023_24_covid-19_novavax.pdf

Vaccination des professionnels



RECOMMANDATIONS VACCINALES

RECOMMANDATION

Obligations et recommandations vaccinales des professionnels

Actualisation des recommandations et obligations pour les étudiants et professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et en contact étroit avec de jeunes enfants

Volet 1/2 : diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatite B, Covid-19

Validé par le Collège le 29 mars 2023

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-03/obligations_et_recommandations_vaccinales_des_professionnels_actualisation_des_reco_et_obligations_pour_les_etudiants_et_pr.pdf



RECOMMANDER DES STRATÉGIES DE SANTÉ PUBLIQUE

RECOMMANDATION

Actualisation des recommandations et obligations vaccinales des professionnels

Volet 2/2 : coqueluche, grippe saisonnière, hépatite A, rougeole, oreillons, rubéole, varicelle

Validé par le Collège le 27 juillet 2023

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-07/actualisation_des_recommandations_et_obligations_vaccinales_des_professionnels_coqueluche_grippe_saisonniere_hepatite_a_rouge.pdf



ACTUALISATION DES RECOMMANDATIONS ET OBLIGATIONS VACCINALES DES PROFESSIONNELS

Ces recommandations et obligations vaccinales concernent les professionnels de santé, les professionnels exerçant en établissements de santé et structures médico-sociales, ainsi que les professionnels en contact étroit et répété avec de jeunes enfants (1)

Situation actuelle			Modifications envisagées		
	Maladie	Vaccins disponibles	Connaissances actuelles	Maladie	Préconisations
Obligations (2)	Diphtérie	Pas de vaccin non combiné disponible en France 2 vaccins tétravalents	Risque de transmission soignant/soigné très faible	Diphtérie	Maintien en obligation seulement pour Maroc en raison de la circulation du germe de la diphtérie sur ce territoire et de la faible couverture vaccinale de la population
	Tétanos		Risque de transmission soigné/soignant inexistant	Tétanos	
	Poliomyélite (Coqueluche)		Maladie en voie d'éradication	Poliomyélite (Coqueluche)	
	Hépatite B		CF recommandations vaccinales	Hépatite B	
Recommandations (3)	Covid-19*	2 vaccins non combinés 1 vaccin combiné hépatite A	Transmission lors des soins possible (via AES)	Rougeole	Obligation maintenue ou étendue pour : Les étudiants, les professionnels libéraux exposés à un risque de contamination, les professionnels des ES et ESMS exposés à un risque d'AES
		4 vaccins à ARNm 2 vaccins à protéine adjuvante	Gestes barrière et efficacité vaccinale faible sur infection et transmission	Oreillons Rubéole	Obligation pour les étudiants en santé, les professionnels de santé et ceux en contact avec de jeunes enfants sans état documenté de rougeole
			*Obligation vaccinale suspendue le 13 mai 2023 par décret pour devenir une recommandation	Diphtérie Tétanos	Vaccination fortement recommandée chez les étudiants et professionnels
	Coqueluche	Pas de valence coqueluche non combinée	Couverture vaccinale élevée des nourrissons en âge d'être vaccinés Transmission d'un soignant à un nourrisson rare	Poliomyélite Coqueluche	Objectif de 70% de couverture vaccinale fixé par la stratégie nationale pour les professionnels en ES
	Rougeole	Pas de vaccin non combiné disponible en France 2 vaccins à trois valences	Maladie très contagieuse, fardeau hospitalier et cas nosocomiaux	Grippe saisonnière	Recommandations pour les professionnels de santé et ceux en contact étroit avec de jeunes enfants
	Oreillons Rubéole		Transmission nosocomiale rare	Hépatite A	Professionnels de santé et métiers de la petite enfance en l'absence d'antécédents cliniques de varicelle
	Grippe saisonnière		Maladie éradiquée en France	COVID-19	Fortes recommandations y compris pour les rappels
	Hépatite A		Fardeau nosocomial non connu		
	Varicelle	3 vaccins non combinés 1 vaccin combiné hépatite B	Efficacité vaccinale imparfaite		
	COVID-19*	2 vaccins vivants atténués	Endémie faible en France Transmission nosocomiale faible		

CPIas Bretagne - Août 2023, page 1/2

Fiche synthétique en annexe de ce document