

<p>1. Après un lavage des mains pour limiter le dessèchement et l'irritation :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincer abondamment, sécher par tamponnement 2. Rincer abondamment, sécher par frottement 3. Appliquer une dose de solution hydro-alcoolique 	<p>2. Quelles sont les recommandations générales de toute procédure d'hygiène des mains ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manches longues 2. Présence d'alliance lisse 3. Ongles courts, propres, sans vernis 4. Absence de bijoux
<p>3. Le lavage simple des mains est plus efficace que la friction hydro-alcoolique ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vrai 2. Faux 	<p>4. Quelle technique d'hygiène des mains est à privilégier immédiatement après un contact avec un liquide biologique ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lavage simple 2. Lavage simple + Séchage complet + Friction hydro-alcoolique si nouveau soin 3. Friction hydro-alcoolique
<p>5. L'hygiène des mains à privilégier en première intention s'effectue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avec de l'eau et du savon doux 2. Avec un produit hydro-alcoolique 	<p>6. A quel moment doit-on réaliser une friction avec une solution hydro-alcoolique ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Après s'être mouché 2. Après être allé aux toilettes 3. Après le retrait des gants 4. Entre 2 résidents
<p>7. La friction hydro-alcoolique me dessèche moins les mains que le lavage au savon doux car :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Je n'utilise jamais ou très rarement les produits hydro-alcooliques 2. Les produits hydro-alcooliques contiennent des agents hydratants ou de la glycérine 3. Le savon même doux contient des détergents qui altèrent le film hydrolipidique de la peau 	<p>8. Mes mains sont souillées par des selles. Quel type d'hygiène des mains dois-je effectuer immédiatement ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lavage à l'eau et au savon simple 2. Brossage soigneux au liquide vaisselle 3. Désinfection à l'eau de Javel 4. Désinfection par friction hydro-alcoolique

<p>9. Je ne dois pas faire de friction hydro-alcoolique lorsque :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mes mains sont mouillées 2. Mes mains sont visiblement souillées 3. Je suis enceinte (l'alcool est contre-indiqué) 4. Je prends des antibiotiques 	<p>10. Pour réaliser une friction hydro-alcoolique efficace :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Je prends une quantité équivalente à 1 creux de main 2. Je respecte les étapes pour désinfecter toutes les zones des mains et poignets 3. Je frictionne jusqu'au séchage complet 4. Je fais attention à bien frotter toute la surface de mon alliance
<p>11. Pour prévenir les irritations de mes mains par la friction avec une solution hydro-alcoolique:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. J'applique une très petite quantité de produit hydro-alcoolique 2. Je frictionne mes mains jusqu'au séchage complet de la solution et la sensation d'une peau douce 3. J'attends le séchage complet des mains avant d'enfiler les gants 4. Je préfère réaliser un lavage à l'eau et au savon 	<p>12. La friction hydro-alcoolique est plus efficace que le lavage des mains pour éliminer les microorganismes ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vrai 2. Faux
<p>13. En EHPAD, le port de l'alliance est toléré pour les professionnels prenant en charge des résidents ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oui si elle est bien lisse 2. Non c'est un bijou 3. Oui car mon mari serait affreusement vexé si je l'enlève 	<p>14. Je peux porter du vernis sur les ongles :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oui, l'EHPAD n'est pas l'Hôpital 2. Oui seulement si c'est du vernis transparent 3. Non en aucun cas
<p>15. Pour quel(s) type(s) d'activité doit-on porter des gants ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ablation d'un pansement souillé 2. Accompagnement un résident en salle à manger 3. Pour un effleurage (prévention escarre) 4. Pour un changement de protection 	<p>16. Dans quelles situations faut-il porter des gants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lors d'un contact avec la peau d'un résident 2. Dès l'entrée dans la chambre d'un résident porteur d'une BMR 3. Dès l'entrée dans la chambre d'un résident ayant une gastro-entérite aiguë 4. S'il y a un risque de contact avec un liquide biologique

<p style="text-align: center;">17. Les gants :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dispensent de l'hygiène des mains 2. Demandent une désinfection des mains après le retrait 3. Peuvent être stockés dans les poches 	<p>18. Si je porte des gants à usage unique, je fais une désinfection des mains par friction :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Après les avoir ôtés 2. Avant de les mettre et après les avoir ôtés 3. Ni l'un ni l'autre, les gants me protègent
<p>19. Dans quelle(s) situation(s) dois-je mettre un tablier de protection à UU ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribution des médicaments 2. Soins de nursing 3. Ablation d'une sonde urinaire 4. Changement de protection d'un résident 	<p>20. Dans le cadre des précautions standard, citez les différents équipements de protection individuelle</p> <p style="text-align: center;">Gants à usage unique, tablier à usage unique imperméable, masque chirurgical, protection oculaire.</p>
<p style="text-align: center;">21. Le tablier s'utilise :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lors d'une gale 2. Pour plusieurs résidents 3. Lors de la toilette d'un résident 	<p>22. Dans quelle(s) situation(s) de soin le port d'un tablier à UU est-il requis ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toilette complète au lit 2. Retrait du bassin 3. Installation du résident au lavabo
<p>23. Je peux porter le même tablier de protection pour réaliser la toilette de plusieurs résidents ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vrai 2. Faux 	<p style="text-align: center;">24. Le masque chirurgical :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S'utilise dès qu'un résident tousse 2. Peut se garder autour du cou 3. S'utilise par un soignant enrhumé

<p>25. En EHPAD, il est recommandé de changer sa tenue professionnelle tous les :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jours 2. 2 jours 3. 3 jours 4. 7 jours 	<p>26. Vous devez brosser un bassin fortement souillé, comment vous protégez –vous ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Je porte des lunettes de protection et un masque chirurgical 2. Je mets des gants à usage unique 3. Je porte un tablier imperméable à usage unique 4. Je travaille bras tendus au maximum
<p>27. Les recommandations nationales préconisent pour l'entretien du seau d'un montauban ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le lave-bassins 2. Vider dans le vidoir, tremper dans une solution détergente-désinfectante, nettoyage, rinçage et séchage 3. Vider dans les sanitaires et rincer avec la douchette 4. Ne pas rincer avec une douchette 5. Utiliser des sacs protecteurs 	<p>28. Qu'entend-on par « excréta » :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selles et urines 2. vomissures 3. Sueur 4. Sang
<p>29. Les précautions « standard »</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Servent à protéger uniquement le résident 2. Servent à protéger uniquement le soignant 3. Servent à protéger le soignant et le résident 	<p>30. Je suis frileuse, au travail je porte un gilet sur ma tenue professionnelle :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uniquement si je sors 2. En permanence 3. En dehors de tous soins
<p>31. Comment dois-je entretenir ma tenue professionnelle ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Je l'apporte au pressing 2. Je l'élimine dans le sac dédié du vestiaire du personnel 3. Je la lave chez moi sans la mélanger au reste de mon linge personnel 	<p>32. Les collecteurs pour objet piquant, coupant, tranchant, doivent-êtr e ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Munis d'une fermeture provisoire et définitive 2. À disposition au plus près du soin 3. Fixés s'ils sont disposés sur un chariot 4. Remplis uniquement par des aiguilles

<p>33. Le collecteur pour objet piquant coupant tranchant est utilisé :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Par l'animation en guise de pot à crayons 2. Pour éliminer les aiguilles ou les lames de rasoir 3. En cuisine pour ranger les couteaux 	<p>34. Je ferme définitivement puis j'élimine le collecteur à Objet Piquant Tranchant Coupant :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lorsque la limite maximum de remplissage est atteinte 2. Systématiquement toutes les semaines 3. Pas de panique ! tant que les aiguilles ne dépassent pas, tout va bien
<p>35. Le bain pré-désinfectant du matériel de soins doit être renouvelé :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Une fois par 24H00 2. Si souillures du bain 3. Tous les 29 février 	<p>36. A quelle fréquence désinfectez-vous le chariot douche de l'Ehpad ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Après chaque utilisation 2. Une fois par semaine 3. Une fois par mois 4. Une fois par trimestre
<p>37. Les bas d'une résidente sont souillés d'urine et de selles :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Je les lave dans le lavabo de la résidente 2. Je les mets dans le sac de pré-tri du linge 3. Je les rince puis je les mets dans le sac de pré-tri du linge 4. Je les mets dans un sac étanche et l'envoie en lingerie 	<p>38. Quelle(s) précaution(s) doit-on prendre pour manipuler du linge souillé de liquides biologiques ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Porter des gants 2. Porter un tablier imperméable à usage unique 3. Ne pas le déposer à même le sol 4. Le rincer avant de l'évacuer de la chambre
<p>39. Le port d'équipements de protection individuelle servent à :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Protéger seulement le résident 2. Protéger seulement le soignant 3. Protéger les deux 4. Prévenir le risque de transmission croisée patient/soignant 	<p>40. Je porte une protection oculaire si :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Je revêts les autres équipements de protection (gants, masque, tablier ou surblouse) 2. Je vidange une sonde à demeure 3. J'effectue un entretien manuel d'un bassin (à défaut de lave-bassin ou de sacs de protection) 4. Lors du renouvellement du grand bain de désinfection