

PRECAUTION COMPLEMENTAIRE Réponses

1. **Pour l'entretien de la chambre d'un résident présentant une gastro-entérite aiguë, j'applique :**
Le protocole de bionettoyage avec un produit virucide à spectre total
2. **Qu'est-ce qu'une GEA ?**
Une Gastro-Entérite Aigüe
3. **Ce matin, Mme X, âgée de 85 ans, présente brutalement deux épisodes de diarrhée. Elle a vomi. Deux autres résidents se plaignent de nausées. Comment réagissez-vous ?**
Vous demandez à ces résidents de rester dans leur chambre
Je préviens l'IDE et / ou le médecin et l'ide hygiéniste
4. **Lors de GEA**
Aucune bonne réponse
5. **Lors d'une épidémie de gastro-entérite aiguë, il faut :**
Renforcer l'hygiène des mains et Recenser les cas et signaler à l'infirmière ou au médecin
6. **En cas d'épidémie de gastro-entérite aiguë, j'entretiens l'environnement avec :**
Le protocole eau de Javel
Un produit détergent-désinfectant sporicide
un produit détergent désinfectant virucide sur norovirus et rotavirus
7. **Les précautions complémentaires :**
Viennent en complément des précautions « standard »
S'appliquent sur prescription médicale ou selon le protocole
8. **Qu'est-ce qu'une BHRe :**
Une Bactérie Hautement Résistante émergente
9. **Qu'est-ce qu'une IRA :**
Une Infection Respiratoire Aiguë
10. **Que signifie BMR ?**
Bactérie Multi Résistante aux antibiotiques
11. **Quelles précautions complémentaires n'existent pas :**
Précautions Complémentaire Eau (PCE)
Précautions Complémentaire Surface (PCS)
12. **Lors d'une épidémie en EHPAD, il est recommandé d'annuler toutes les animations collectives :**
Faux
13. **Devant un résident présentant la gale, il faut :**
Mettre en place des précautions complémentaires de type contact
Après le contact avec le résident, faire un lavage des mains au savon et un séchage avant de se frictionner les mains
14. **Lors de gale, après le contact avec le résident :**
Je me lave les mains au savon, je les sèche puis je me les frictionne avec une solution hydro-alcoolique
15. **Devant un résident suspect d'être porteur de la gale, je mets :**
Une surblouse à manches longues et des gants

PRECAUTION COMPLEMENTAIRE Réponses

16. **Une IDE et une aide-soignante aident un résident dépendant porteur de gale à se vêtir, elles portent des gants. A la fin du soin, après avoir jeté les gants, elles réalisent une FHA :**
Non adapté
17. **Lors d'épisode de diarrhées à *Clostridioides difficile*, après le contact avec le résident:**
Je me lave les mains au savon, je les sèche, puis je me les frictionne avec une solution hydro-alcoolique
18. **Si infection à *Clostridioides difficile*, lors de l'entretien des locaux avec de l'eau de Javel, il faut :**
Réaliser une déterSION, un rinçage et séchage au préalable
Appliquer une dilution précise au 1/5
Respecter un temps de contact de 10 min
19. **Pourquoi les infections à *Clostridioides difficile* nécessitent-elles des mesures particulières ?**
Les produits détergents-désinfectants habituels sont inefficaces
La bactérie survit dans l'environnement sous forme de spore
Les produits hydro-alcooliques de désinfection des mains sont inefficaces
20. **Devant un résident présentant une IRA, je mets un masque :**
Chirurgical et A l'entrée de la chambre
21. **Je suis enrhumé(e) et je porte un masque chirurgical. Lorsque je l'enlève, je le jette :**
Dans les déchets assimilés aux ordures ménagères (DAOM)
22. **Pour prendre en charge un résident grippé, quel type de masque, dois-je porter ?**
Masque chirurgical
23. **Comment entretenez-vous la vaisselle d'un résident en précautions complémentaires gouttelettes?**
En lave-vaisselle
24. **Lorsqu'un résident souffre d'une Infection Respiratoire Aiguë, quel est l'intérêt de faire un test grippe**
Prévenir le risque d'épidémie
25. **Quelles sont les règles à respecter pour optimiser l'efficacité d'un masque chirurgical ?**
L'attacher au plus près du visage avec deux liens, barrette pincée
26. **Le linge sale d'un résident grippé doit :**
Suivre le circuit habituel d'évacuation du linge sale
27. **Pour faire le diagnostic de la grippe, j'utilise un TROD avec :**
Des gants, un masque, des lunettes, un tablier plastique
28. **Pour prévenir les épidémies de grippe, les professionnels doivent :**
Porter un masque s'ils présentent des symptômes respiratoires et Se vacciner chaque année
29. **En période hivernale, un résident présente un début de toux, et une fièvre à 39°. Que faut-il faire ?**
Informer l'IDE et le médecin
Réaliser un (TROD) de grippe sur prescription ou selon le protocole
Mettre un masque lors de la prise en charge du résident
30. **Lors d'une suspicion de tuberculose pulmonaire chez un résident, il faut :**
Faire porter un masque chirurgical au résident s'il circule hors de sa chambre
Porter un appareil de protection respiratoire type FFP2 avant de rentrer dans la chambre
Maintenir le résident en chambre seule, porte fermée

PRECAUTION COMPLEMENTAIRE Réponses

31. **Quel type de précautions mettez-vous en place en EMS chez un résident porteur d'une BMR urinaire?**
Précautions standard
32. **Pour prendre en charge un résident porteur d'une BHRé :**
Je respecte les précautions standard
Je privilégie une chambre seule
Je l'autorise à participer aux activités communes
33. **Dans le service, j'entretiens la chambre du résident selon le protocole « eau de Javel » uniquement si infection à :**
Gastro-entérite aiguë et *Clostridium difficile*
34. **Quand peut-on lever les Précautions Complémentaires auprès d'un résident présentant une Gastro-Entérite Aiguë ?**
48 h - 72H après la fin des symptômes
35. **En période hivernale, je recense les résidents présentant des symptômes d'IRA ou de GEA sur une grille de surveillance ?**
Une fois par équipe et Une fois par jour
36. **La solution hydro-alcoolique est efficace, si elle répond à la norme EN NF 14496 :**
Sur le virus de la grippe
Sur les virus de la gastro-entérite aiguë
37. **Le virus de la grippe se transmet principalement par :**
Les gouttelettes respiratoires
38. **Le virus de la gastro-entérite aiguë se transmet par :**
L'environnement et Les mains
Les excréta
39. **Quel est l'intérêt de recenser quotidiennement, à minima, les résidents présentant des symptômes d'IRA ou GEA sur une grille de surveillance, pendant la période hivernale :**
Détecter au plus tôt le début d'une épidémie pour la juguler
Être réactif dans la mise en place des mesures de précautions
40. **Après un épisode épidémique de GEA ou d'IRA, avec l'équipe :**
Je recherche et je liste les dysfonctionnements éventuels au cours de l'épisode
Je recherche des solutions aux dysfonctionnements recensés
Je mets en place des actions pour prévenir ces dysfonctionnements lors d'un prochain épisode