

SOINS Réponses

1. **Pour un soin d'hygiène bucco dentaire, je mets des gants :**
Systématiquement
2. **Pour une injection sous-cutanée je n'ai pas besoin de gants :**
Faux
3. **Lors de la réfection d'un pansement complexe :**
Je porte des gants
Je porte un tablier plastique à usage unique
4. **Lors d'un sondage urinaire :**
Je respecte le système clos
Je réalise une antiseptie
5. **Lors de la pose d'une perfusion sous-cutanée :**
Je réalise une antiseptie de la peau en 1 temps + séchage
J'utilise un antiseptique alcoolique
J'alterne les sites d'injections
6. **Lors de la toilette au lit d'un résident :**
Je mets des gants pour la toilette intime
Je mets un tablier plastique à usage unique
7. **Lors d'un traitement d'un résident par aérosol, entre deux utilisations :**
Je nettoie la cuve de nébulisation avec de l'eau stérile
8. **Je peux laisser en place une perfusion sous-cutanée (IDE) :**
96H
9. **Pour prévenir le risque infectieux sur sonde urinaire (IDE) :**
Je réalise une toilette intime dès que la sonde est souillée par des selles
Je maintiens toujours le système clos
10. **Je maintiens le système clos d'une sonde à demeure quand :**
Je ne déconnecte jamais la sonde du sac collecteur
Je pose ou retire la sonde urinaire, connectée au sac collecteur
Je vidange les urines de façon aseptique
11. **Je préviens le risque infectieux d'une sonde à demeure quand :**
Je fixe la sonde à la cuisse du résident pour éviter une traction
Je maintiens le collecteur en position déclive (sous le niveau de la vessie)
12. **Je préviens le risque infectieux lors de la manipulation des robinets des tubulures de perfusion :**
Je réalise préalablement une friction hydro-alcoolique
J'utilise une compresse stérile imprégnée d'un antiseptique alcoolique pour ouvrir le robinet
13. **Lors de la pose d'une perfusion sous-cutanée :**
J'effectue une désinfection avec un antiseptique alcoolique
J'utilise un dispositif sécurisé
J'utilise un pansement transparent semi-perméable
14. **Le collecteur à aiguilles :**
Doit être positionné au plus près du soignant
15. **Je manipule le robinet de vidange d'une sonde à demeure (AS):**
Avec des gants non stériles
Avec une compresse stérile et un antiseptique alcoolique
16. **Pour prévenir le risque infectieux sur sonde à demeure**
Je ne mets pas d'antiseptique lors de la toilette intime
J'effectue une toilette intime dès lors qu'il y a présence de selles

SOINS Réponses

17. **Lors de l'utilisation de rasoir à usage unique, je le jette :**
Dans le collecteur à aiguilles
18. **Lors de la toilette du résident, je porte des gants :**
Uniquement pour la toilette intime
En cas de lésions cutanées
19. **Après désinfection de l'aérosol (réservoir et masque), je le rince avec :**
De l'eau stérile
20. **C'est l'heure du coucher, une aide-soignante vient de nettoyer la prothèse dentaire d'un résident. Que fait-elle de la prothèse dentaire ?**
Elle la replace dans la bouche du résident (après soin de bouche)
Elle la met au sec dans un boîtier
21. **Pour poser une perfusion sous cutanée, l'IDE porte :**
Des gants à usage unique non stériles
22. **Le sac collecteur d'un résident porteur d'une sonde urinaire à demeure doit être changé :**
Seulement lors du changement de sonde
23. **Pour poser une perfusion sous-cutanée, j'utilise de préférence :**
Un cathéter périphérique sécurisé
24. **Je réalise le change d'un résident incontinent. Je mets des gants à usage unique :**
Juste avant de retirer le change
25. **Une résidente présente des rougeurs au niveau des plis sous-mammaires :**
Je préviens l'infirmier(e)
Après nettoyage au savon non moussant, je veille au rinçage et séchage corrects des plis
26. **Le pansement de maintien du cathéter de perfusion est en partie décollé :**
Il faut changer le pansement au plus vite
27. **Un prélèvement pour examen cyto bactériologique peut être pratiqué par un(e) AS car cet acte fait partie du rôle propre de l'IDE**
Faux
28. **La réfection des lits se pratique à mains nues.**
Vrai
29. **Pour pratiquer une injection IV, IM ou sous-cutanée, le port de gants non stériles est recommandé**
Vrai
30. **Je peux connecter un sac collecteur non stérile :**
À une poche de stomie
À un étui pénien
31. **Après une aspiration endo-trachéale,**
Je jette le masque chirurgical
32. **Pour réaliser une aspiration endo-trachéale, je revêts :**
Des gants, un masque, une tenue de protection et des lunettes de sécurité
33. **Quelles affirmations sont vraies ? Lors d'aspiration endo-trachéale, je change :**
La sonde d'aspiration à chaque fois
34. **En cas de pratiques successives d'une aspiration rhino-pharyngée et d'une aspiration bucco-pharyngée j'utilise deux sondes ?**
Vrai

SOINS Réponses

35. **Au cours du rasage d'un résident vous vous coupez le doigt avec la lame de rasoir, que faites-vous ?**
Je lave immédiatement mon doigt au savon puis le trempe dans un antiseptique pendant 5 minutes
Je demande une prise en charge médicale dans les 4h en suivant le protocole de l'EHPAD
36. **Votre collègue retire ses gants et réalise une friction hydro-alcoolique après avoir fini la toilette intime d'un résident.**
Elle applique les bonnes pratiques
37. **Un résident diabétique réalise seul ses contrôles glycémiques. Il dépose ses « lancettes » ou auto-piqueurs usagés dans :**
Le collecteur pour OPCT
38. **L'infirmière se pique la main avec le stylo à insuline qu'elle vient d'utiliser pour un résident. Que fait-elle ?**
Elle stoppe son activité et effectue immédiatement les premiers soins
39. **Quand l'aide soignante doit elle entretenir le coupe-ongles ?**
Entre chaque résident
40. **Lucie vient de couper les ongles d'un résident, avec quoi peut-elle nettoyer le coupe-ongles?**
Un Détergent Désinfectant