

SOINS Réponses

1. Pour un soin d'hygiène bucco dentaire, je mets des gants :

Réponse 1 : Systématiquement

2. Pour une injection sous-cutanée je n'ai pas besoin de gants :

Réponse 1 : VRAI

3. Lors de la réfection d'un pansement complexe :

Réponse 1 : Je porte des gants

Réponse 2 : Je porte un tablier plastique à usage unique

4. Lors d'un sondage urinaire :

Réponse 1 : Je respecte le système clos

Réponse 2 : Je réalise une antisepsie

5. Lors de la pose d'une perfusion sous-cutanée :

Réponse 2 : je ne porte pas de gants

Réponse 3 : J'utilise un antiseptique alcoolique

Réponse 4 : J'alterne les sites d'injections

6. Lors de la toilette au lit d'un résident :

Réponse 2 : Je mets des gants pour la toilette intime

Réponse 4 : Je mets un tablier plastique à usage unique

7. Lors d'un traitement d'un résident par aérosol, entre deux utilisations :

Réponse 1 : Je nettoie la cuve de nébulisation avec de l'eau stérile

Réponse 2 : Je nettoie la cuve de nébulisation avec du sérum physiologique

8. Je peux laisser en place une perfusion sous-cutanée (IDE) :

Réponse 3 : 96H

9. Pour prévenir le risque infectieux sur sonde urinaire (IDE) :

Réponse 3 : Je réalise une toilette intime dès que la sonde est souillée par des selles

Réponse 4 : Je maintiens toujours le système clos

10. Je maintiens le système clos d'une sonde à demeure quand :

Réponse 2 : Je ne déconnecte jamais la sonde du sac collecteur

Réponse 3 : Je pose ou retire la sonde urinaire, connectée au sac collecteur

Réponse 4 : Je vidange les urines de façon aseptique

11. Je préviens le risque infectieux d'une sonde à demeure quand :

Réponse 1 : Je fixe la sonde à la cuisse du résident pour éviter une traction

Réponse 4 : Je maintiens le collecteur en position déclive (sous le niveau de la vessie)

12. Je préviens le risque infectieux lors de la manipulation des robinets des tubulures de perfusion :

Réponse 1 : Je réalise préalablement une friction hydro-alcoolique

Réponse 2 : J'utilise une compresse imprégnée d'un antiseptique alcoolique pour ouvrir le robinet

13. Lors de la pose d'une perfusion sous-cutanée :

Réponse 1 : J'effectue une désinfection avec un antiseptique alcoolique

Réponse 2 : J'utilise un dispositif sécurisé

Réponse 3 : J'utilise un pansement transparent semi-perméable

14. Le collecteur à aiguilles :

Réponse 1 : Doit être positionné au plus près du soignant

15. Je manipule le robinet de vidange d'une sonde à demeure (AS):

Réponse 2 : Avec des gants non stériles

Réponse 3 : Avec une compresse et un antiseptique alcoolique

16. Pour prévenir le risque infectieux sur sonde à demeure :

Réponse 2 : Je ne mets pas d'antiseptique lors de la toilette intime

SOINS Réponses

Réponse 3 : J'effectue une toilette intime dès lors qu'il y a présence de selles

17. Lors de l'utilisation de rasoir à usage unique, je le jette :

Réponse 2 : Dans le collecteur à aiguilles

18. Lors de la toilette du résident, je porte des gants :

Réponse 2 : Uniquement pour la toilette intime

Réponse 3 : En cas de lésions cutanées

19. Après désinfection de l'aérosol (réservoir et masque), je le rince avec :

Réponse 1 : du sérum physiologique

Réponse 3 : de l'eau stérile

20. C'est l'heure du coucher, une aide-soignante vient de nettoyer la prothèse dentaire d'un résident. Que fait-elle de la prothèse dentaire ?

Réponse 1 : elle le replace dans la bouche du résident

Réponse 3 : Elle la met au sec dans un boîtier fermé

21. Pour poser une perfusion sous cutanée, l'IDE porte :

Réponse 4 : RIEN

22. Le sac collecteur d'un résident porteur d'une sonde urinaire à demeure doit être changé :

Réponse 3 : Seulement lors du changement de sonde

23. Pour poser une perfusion sous-cutanée, j'utilise de préférence :

Réponse 2 : Un cathéter périphérique sécurisé

24. Je réalise le change d'un résident incontinent. Je mets des gants à usage unique :

Réponse 2 : Juste avant de retirer le change

25. Une résidente présente des rougeurs au niveau des plis sous-mammaires :

Réponse 1 : Je prévient l'infirmier(e)

Réponse 2 : Après nettoyage au savon non moussant, je veille au rinçage et séchage corrects des plis

26. Le pansement de maintien du cathéter de perfusion est en partie décollé :

Réponse 2 : Il faut changer le pansement au plus vite

27. Une aide-soignante doit faire une toilette à un résident dont ses urines sont troubles et sentent fort, que fait-elle ?

Réponse 1 : Elle prévient l'infirmière

Réponse 3 : Elle le notifie dans les transmissions

28. La réfection des lits se pratique à mains nues.

Réponse 1 : Vrai

29. Pour pratiquer une injection IM ou sous-cutanée, le port de gants non stériles est recommandé

Réponse 2 : Faux

30. Je peux connecter un sac collecteur non stérile :

Réponse 1 : À une poche de stomie

Réponse 3 : À un étui pénien

31. Après une aspiration endo-trachéale,

Réponse 1 : Je jette le masque chirurgical

32. Pour réaliser une aspiration endo-trachéale, je revêts :

Réponse 3 : Des gants, un masque, une tenue de protection et des lunettes de sécurité

33. Lesquelles des affirmations sont vraies ? Lors d'aspiration endo-trachéale, je change :

SOINS Réponses

Réponse 2 : La sonde d'aspiration à chaque fois

34. **En cas de pratiques successives d'une aspiration rhino-pharyngée et d'une aspiration bucco-pharyngée j'utilise deux sondes ?**

Réponse 1 : Vrai

35. **Au cours du rasage d'un résident vous vous coupez le doigt avec la lame de rasoir, que faites- vous ?**

Réponse 2 : Je lave immédiatement mon doigt au savon puis le trempe dans un antiseptique pendant 5 minutes

Réponse 3 : Je demande une prise en charge médicale dans les 4h en suivant le protocole de l'EHPAD

36. **Votre collègue retire ses gants et réalise une friction hydro-alcoolique après avoir fini la toilette intime d'un résident.**

Réponse 3 : Elle applique les bonnes pratiques

37. **Un résident diabétique réalise seul ses contrôles glycémiques. Il dépose ses « lancettes » ou autopiqueurs usagés dans :**

Réponse 2 : Le collecteur pour OPCT

38. **L'infirmière se pique la main avec le stylo à insuline qu'elle vient d'utiliser pour un résident. Que fait-elle ?**

Réponse 2 : Elle stoppe son activité et effectue immédiatement les premiers soins

39. **Quand l'aide soignante doit elle entretenir le coupe-ongles ?**

Réponse 1 : Entre chaque résident

40. **Lucie vient de couper les ongles d'un résident, avec quoi peut-elle nettoyer le coupe-ongles?**

Réponse 3 : Un Détergent Désinfectant